



### Carsten Edmund

Øjenlæge, dr.med. – Formand for Øjenforeningen



# Gør ikke skade

**H**VERT ÅR udføres flere end 50.000 operationer for grå stær, og de udgør 90 pct. af alle operationer, der foretages inde i øjet. Når det er øjenlægenes

fornemste opgave at forhindre synstab og blindhed, er det tankevækkende, at langt hovedparten af grå stær-patienterne ikke er i nærheden af alvorlige synstab på operationstidspunktet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom risikoen for alvorlige bivirkninger er lille ved grå stær-operationer, er den ikke ubetydelig: Nethindeløsning er

en alvorlig synstruende komplikation, hvis hyppighed formentlig livslangt er fire gange så stor for opererede grå stær-patienter som hos ikke-opererede. Da resultatet af en grå stær-operation ikke forringes af at blive udskudt, bør patienten have væsentlige synsklager, inden operation tilbydes, således at der er et rimeligt forhold mellem den

mulige synsgevinst og risikoen for synstab ved operation.

Der foretages i dag dobbelt så mange grå stær-operationer som i år 2000, og heller ikke dengang var flertallet af patienterne i nærheden af alvorlige synstab på operationstidspunktet. Da de umiddelbare komplikationer var aftagende, opererede man tidligere og tidligere med faldende alder til

følge. I de senere år er operationen også tilbudt patienter, der ønskede brillefrihed, for eksempel i forbindelse med alderssyn (gammelmandssyn).

Øjenforeningen går selvfølgelig ind for,

at alle patienter med betydende synsklager skal tilbydes operation, hvis denne i væsentlig grad kan eliminere synsklagerne. Operationen påfører dog patienten en livslang øget risiko for at gøre mere skade end gavn.

Læs mere om problemstillingen i artiklen på side 19. ■

”

Operationen påfører dog patienten en livslang øget risiko for at gøre mere skade end gavn.